

## 8 定期の予防接種の対象者及び接種期間

		6週	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1歳	3月	6月	7月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	
ロタ	ロタリックス(1価)	③ 6週0日後から24週0日までに27日以上の間隔をあけて2回接種											【初回】標準的には生後2か月から14週6日までに接種									
	ロタテック(5価)	6週0日後から32週0日までに27日以上の間隔をあけて3回接種																				
B型肝炎		標準的には生後2か月から生後9か月に達するまでの期間に接種 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて3回目を接種																				
ヒブ	接種開始年齢	2～6か月																				
	2～6か月	【初回】生後12か月までに27日以上、標準的には27～56日までの間隔をあけて3回接種 【追加】初回接種後7か月以上、標準的には初回接種終了後7か月～13か月までの間に追加接種 (初回2回目3回目の接種が12か月を過ぎた場合行わない。ただし27日以上の間隔をおいて追加接種は可能。)																				
	※注 7か月～1歳未満	初回：2回 追加：1回																				
	1歳以降	1回																				
小児肺炎球菌	接種開始年齢	2～6か月																				
	2～6か月	【初回】生後12か月までに27日以上の間隔で3回接種 【追加】生後12か月以降であって、初回終了後60日以上あけて接種(標準的には1歳～1歳3か月の間で接種) (初回2回目の接種が12か月を過ぎた場合、3回目は行わない。ただし追加接種は可能。)																				
	※注 7か月～1歳未満	初回：2回 追加：1回																				
	1歳	2回(60日以上あける)																				
	2歳以降	1回																				
DPT-IPV 四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ)		【初回】20日以上、標準的には20～56日までの間隔をおいて3回接種 【追加】初回終了後、6か月以上の間隔をおいて接種(標準的には12か月～18か月の間で接種)																				
BCG (結核)		標準的には、生後5か月～生後8か月に達するまでの期間に接種																				
MR二種混合 (麻しん・風しん)		1歳のお誕生日を迎えたら早めに接種しましょう。											<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">第2期:1回</div> 就学前年度の3月31日まで 小学校就学前の1年間、いわゆる幼稚園児等の年長児が対象です									
水痘 (水ぼうそう)		【2回目】初回接種後6～12か月の間に接種																				
日本脳炎		【初回】6日以上、標準的には6～28日までの間隔をおいて2回接種 【追加】初回接種終了後6か月以上、標準的には概ね1年の間隔をおいて接種																				

予防接種法に定められた定期の予防接種を受けられる期間です。  
 病気にかかりやすい時期を考慮して定められた標準的な期間です。

※注:ヒブ及び小児肺炎球菌予防接種は接種開始年齢によって回数が変わります。